



ORSALIT[®]

ІЗ МАЛИНОВО-ЧОРНИЧНИМ СМАКОМ

ПОКАЗАННЯ

ORSALIT[®] NUTRIS - це оральний розчин, для наводнення організму, зі зменшеною осмолярністю та зниженим вмістом натрію і складом відповідно до рекомендацій Європейського товариства гастроентерології, гемодіаліз і харчування дітей (ESPGHAN). Використання оральних розчинів, які підтримують, рекомендується як ESPGHAN, так і BOO3/ ЮНИСЕФ* для поповнення рідин і мінералів, у разі порушень водно-електролітного балансу, в основному під час діареї або блювоти, а також в ситуаціях, коли існує ризик зневоднення.

ORSALIT[®] NUTRIS містить лактоальбумін, білок, що знаходиться в молоці. Лактоальбумін поставляє екзогенні амінокислоти, тобто амінокислоти, які не виробляються організмом людини і повинні надходити до організму разом з їжею.

Завдяки вмісту лактоальбуміну ORSALIT[®] NUTRIS також виконує поживні функції, а його солоний смак ледь відчутний.

* Всесвітня організація охорони Здор'я / фонд Організації Об'єднаних Націй у справах дітей.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

ORSALIT[®] NUTRIS з малиново-ягідним смаком призначений для дітей від 6 місяців життя. Для дітей до 6 місяців та дітям, схильним до алергії, підходить ORSALIT[®] без смакових додатків.

Продукт повинен використовуватися під наглядом лікаря. Не застосовувати для парентерального введення. ORSALIT[®] NUTRIS не є повноцінним джерелом харчування. Його не можна використовувати як єдине джерело їжі.

Продукт не повинен використовуватися, якщо немає ризику зневоднення організму.

Склад

моногідрат глюкози, цитрат натрію, лактоальбумін - білок, отриманий з коров'ячого молока, хлорид натрію, хлорид калію, ароматизатори. ORSALIT[®] NUTRIS не містить фруктів. Продукт містить цукор.

Склад ORSALIT[®] NUTRIS включений в заявку на патент.

Осмолярність розчину: 230 мОсм/л, в тому числі: глюкоза-90 мОсм/л, натрій 60 мОсм/л, хлориди 50 мОсм/л, калій 20 мОсм/л, цитратів 10 мОсм/л.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ

Струсіть пакетики перед відкриттям. Відсутність сипучості порошку в пакету не впливає на якість продукту. Вміст одного пакетика розчинити у 200 мл теплої кип'яченої води. Рідина не слід охолоджувати. ORSALIT[®] NUTRIS можна вводити через трубку. Охолодити перед подачею на стіл. При блювоті рідину вводять часто невеликими порціями (чайною ложкою).

ДОЗУВАННЯ

Дозування залежить від ступеня зневоднення і рекомендацій лікаря. Звичайно рекомендується вводити 50-100 мл орального розчину для наводнення на кг маси тіла протягом перших 4 годин і додатково 5-10 мл на кг маси тіла після кожного діарейного стільця або блювоти. На подальшій стадії наводнення рекомендується вводити 5-10 мл орального розчину на кг маси тіла після кожного діарейного стільця або блювоти.

Добова доза та тривалість застосування ORSALIT[®] NUTRIS, які впливають на досягнення ефекту видужання, залежать від віку, ваги та фази наводнення.

Орієнтовне дозування ORSALIT[®] NUTRIS

Людина, яка отримує ORSALIT [®] NUTRIS	Фаза наводнення (перші 3-4 години наводнення)	Фаза підтримуючого наводнення (подальші етапи наводнення)
Вага тіла від 8 до 12 кг (Вік: від 6 місяців до 1 року)	3 пакетика, розчинені відповідно до інструкції (600 мл). Подавати протягом 3-4 годин	1 пакетик, розчинений відповідно до інструкції (200 мл). Подавати по 100 мл після кожного діарейного стільця або блювоти
Вага тіла від 12 до 15 кг (Вік: від 1 року до 2 років)	4 пакетика, розчинені відповідно до інструкції (800 мл). Подавати протягом 3-4 годин	1 пакетик, розчинений відповідно до інструкції (200 мл). Подавати після кожного діарейного стільця або блювоти
Вага тіла більше ніж 15 кг (вік: від 2 років)	6 пакетиків, розчинених відповідно до інструкції (1200 мл). Подати протягом 3-4 годин	

При використанні схеми дозування, що відповідає наведеній вище таблиці, в першу чергу слід керуватися зазначеною масою тіла.

Профілактика (ризик зневоднення) - препарат використовувати як у фазі підтримувального наводнення.

Застосування і дозування іригаційної рідини ORSALIT[®] NUTRIS була розроблена на основі рекомендацій ESPGHAN, BOO3 / UNICEF.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

ORSALIT[®] NUTRIS не слід використовувати людям з алергією на будь-який компонент препарату, непрохідністю кишківника, сильним зневодненням, що вимагає внутрішньовенного наводнення, а також у людей з виявленою алергією на білок коров'ячого молока. Продукт може споживатися діабетиками, проте необхідний контроль рівня цукру в крові (за вказівкою лікаря).

У разі супутніх захворювань проконсультуйтеся з лікарем для отримання інформації про правильне використання продукту.

СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому, недоступному для маленьких дітей місці, при кімнатній температурі.

ВМІСТ УПАКОВКИ

10 пакетиків по 5,3 г. Вага нетто 53 г.

ВИРОБНИК

Інститут біотехнології сироваток і вакцин BIOMED акціонерне товариство
Ал. Соснова 8, 30-224 Краків
тел.: + 48 12 37 69 200
informacjanaukowa@biomed.pl
www.biomed.pl

Дата розробки: серпень 2013 р.

Дата оновлення: листопад 2021 р.

У продажу також представлені інші смакові версії ORSALIT[®] без додавання лактоальбуміну, а також без додавання лактоальбуміну і смакових додатків для дітей від 6 місяців.

Детальніше про продукт на www.orsalit.pl