



# ORSALIT®

O SMAKU BANANOWYM

## WSKAZANIA

ORSALIT® o smaku bananowym jest doustnym płynem nawadniającym (DPN) o zmniejszonej osmolarności i zredukowanej zawartości sodu oraz składzie zgodnym z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN). Stosowanie doustnych płynów nawadniających jest zalecane zarówno przez ESPGHAN jak i WHO/UNICEF\* do uzupełniania płynów i składników mineralnych w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, głównie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia.

Dzięki wykorzystaniu najbardziej efektywnego mechanizmu jednoczesnego wchłaniania wody, sodu i glukozy, ORSALIT® o smaku bananowym skutecznie nawadnia oraz ogranicza nasilenie biegunki.

\*Światowa Organizacja Zdrowia /Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

## WAŻNA INFORMACJA

ORSALIT® o smaku bananowym przeznaczony jest dla dzieci od 6. miesiąca życia. Dla niemowląt poniżej 6. miesiąca życia i dzieci skłonnych do alergii odpowiedni jest ORSALIT® bez dodatków smakowych. Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza. Nie stosować pozajelitowo. ORSALIT® o smaku bananowym jest żywnością niekompletną. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Produkt nie powinien być stosowany u osób, u których nie występuje ryzyko odwodnienia organizmu.

## SKŁADNIKI

glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromaty, aromaty naturalne.

Produkt zawiera cukier. Nie zawiera białka mleka i laktozy. Produkt bezglutenowy. Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l, w tym: glukoza 90 mOsm/l, sól 60 mOsm/l, chlorki 50 mOsm/l, potas 20 mOsm/l, cytryniany 10 mOsm/l.

## SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Przed otwarciem wstrząsnąć saszetkę. Zawartość aromatów naturalnych może powodować zbrzylenie się i/lub zmianę zabarwienia proszku, co nie wpływa na jakość produktu. Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Płynu nie należy dosładzać. ORSALIT® można podawać przez rurkę. Przed podaniem schłodzić. W przypadku wymiotów płyn podawać często, małymi porcjami (łyżeczką).

## DAWKOWANIE

Dawkowanie zależy od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza. Zwykle zaleca się podawać 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo 5-10 ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach. Na dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Ilość, dobowa dawka oraz czas stosowania, które wpływają na uzyskanie efektu zdrowotnego, są uzależnione od wieku, masy ciała i fazy nawadniania.

## Przykładowe dawkowanie preparatu ORSALIT® o smaku bananowym

Osoba otrzymująca ORSALIT® o smaku bananowym	FAZA NAWADNIANIA (pierwsze 3-4 godziny nawadniania)	FAZA NAWADNIANIA PODTRZYMUJĄCEGO (dalsze etapy nawadniania)
Masa ciała do 4 kg (wiek: do 4 miesięcy)	1 saszetka rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	1 saszetka rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) Podawać 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
Masa ciała od 4 do 8 kg (wiek: do 6 miesięcy)	2 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem (400 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	
Masa ciała od 8 do 12 kg (wiek: od 6 miesięcy do 1 roku)	3 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem (600 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	
Masa ciała od 12 do 15 kg (wiek: od 1 roku do 2 lat)	4 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem (800 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	1 saszetka rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) Podawać po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
Masa ciała powyżej 15 kg (wiek: powyżej 2 lat)	6 saszetek rozpuszczonych zgodnie z zaleceniem (1200 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	

W przypadku zastosowania schematu dawkowania zgodnego z powyższą tabelą, w pierwszej kolejności należy kierować się podaną masą ciała.

## Profilaktyka (ryzyko odwodnienia) – preparat stosować jak w fazie nawadniania podtrzymującego.

Stosowanie i dawkowanie płynu nawadniającego ORSALIT® zostało opracowane w oparciu o zalecenia ESPGHAN, WHO/UNICEF.

## PRZECIWWSKAZANIA

Preparatu ORSALIT® o smaku bananowym nie należy stosować u osób, u których występuje: uczulenie na którykolwiek składnik preparatu, niedrożność jelit lub ciężkie odwodnienie wymagające nawadniania dożylnego.

Produkt może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi (zgodnie z zaleceniami lekarza).

W przypadku chorób współistniejących należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu.

## SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 saszetek po 4,84 g. Masa netto 48,4 g.

## PRODUCENT

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna  
Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków  
tel.: + 48 12 37 69 200  
informacjanaukowa@biomed.pl  
www.biomed.pl

Data opracowania: luty 2006 r.

Data aktualizacji: październik 2021 r.

**W sprzedaży znajdują się również inne wersje smakowe ORSALIT® oraz wersja bez dodatków smakowych dla niemowląt poniżej 6. miesiąca życia.**

**Więcej informacji o produkcie na [www.orsalit.pl](http://www.orsalit.pl)**